

Série AAgWa sur la prévision agricole


Le sorgho en Guinée Bissau

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia** et Khadim Dia***

N° 190, août 2024

La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de dix produits agricoles majeurs dans près de 50 pays africains.


Figure 1. Prévision de la production de sorgho en Guinée-Bissau en 2024.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

nous fournissons des prévisions de la production de sorgho en Guinée-Bissau.

Figure 2. Prévision de la production de sorgho en Guinée-Bissau en 2023.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°190,

En 2024, la production de sorgho en Guinée-Bissau devrait atteindre 21 293 tonnes métriques (TM), ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport aux niveaux de production de 2023. Les niveaux de production de sorgho les plus importants sont attendus dans des districts tels que Bedanda (Tombali), Catio (Tombali), Tite (Quinara) et Cacine (Tombali), avec des volumes de production estimés à 4 241 TM, 4 191 TM, 3 562 TM et 2 776 TM, respectivement. Des valeurs de production plus faibles seront observées à Xitole (Bafatá), Buba (Quinara), Fulacunda (Quinara) et Quebo (Tombali), avec respectivement 384 TM, 1 228 TM, 1 546 TM et 1 680 TM.

Les régions telles que Quebo, Catio, Empada (Quinara) et Bedanda devraient connaître les augmentations de production de sorgho les plus importantes en 2024 par rapport à l'année précédente, avec des différences de 717 TM, 626 TM, 526 TM et 440 TM, respectivement, correspondant à des variations de 74%, 18%, 45% et 12%.

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

*** Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production de sorgho au Sud Soudan en 2024 au niveau des districts

Régions	Districts	Production de 2024 (TM)	Production de 2023 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Bafatá	Xitole	384	293	91	31%
Quinara	Buba	1228	843	385	46%
Quinara	Empada	1685	1158	526	45%
Quinara	Fulacunda	1546	1356	190	14%
Quinara	Tite	3562	3833	-270	-7%
Tombali	Bedanda	4241	3801	440	12%
Tombali	Cacine	2776	2720	56	2%
Tombali	Catio	4191	3565	626	18%
Tombali	Quebo	1680	963	717	74%
Total		21293	18532	2761	15%

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2024 - prod. 2023) divisé par prod. 2023.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2024. *Serie AAgWa sur la prévision agricole : le sorgho en Guinée Bissau*. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°190. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.190/FR>