

Série AAgWa sur la prévision agricole


L'igname au Congo

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia* et Khadim Dia**

N° 274, juin 2025

La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de 11 produits agricoles majeurs dans

Figure 1. Prévision de la production d'igname au Congo en 2025.




Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

En 2025, la production d'igname au Congo devrait atteindre 14 850 tonnes métriques (TM), ce qui correspond à une augmentation de 12 % par rapport aux niveaux de production de 2024. Les productions les plus importantes sont attendues dans les districts du sud, en particulier Loudima (Bouenza), Loandjili (Kouilou), Djambala (Plateaux), Ngabé (Pool), le district de Nkayi (Bouenza) et Gamboma (Plateaux), avec des volumes estimés respectivement à 3 030 TM, 1 689 TM, 1 544 TM, 1 499 TM, 1 490 TM et 1 483 TM. Des valeurs plus faibles seront observées dans des districts tels que Kinkala (Pool), Mvouti (Kouilou), Loukoléla (Cuvette), Mbomo (Cuvette-Ouest) et Mindouli (Pool), affichant respectivement 19 TM, 37 TM, 47 TM, 68 TM et 78 TM.

Par rapport à 2024, les augmentations les plus importantes de la production d'ignames en 2025 devraient se produire dans des districts tels que Ngamaba, Ngabé, Gamboma, Loandjili et Loudima, avec des écarts atteignant respectivement 546 TM, 380 TM, 192 TM, 123 TM et 96 TM et correspondant à des variations de 72 %, 34 %, 15 %, 8 % et 3 %.

près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°274, nous fournissons des prévisions de la production d'igname au Congo.

Figure 2. Prévision de la production d'igname au Congo en 2024.



*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production d’igname au Congo en 2025 au niveau des districts

NAME_1	NAME_2	Production de 2025 (TM)	Production de 2024 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Bouenza	Loudima	3030	2934	96	3 %
Bouenza	Nkayi District	1490	1453	37	3 %
Cuvette	Boundji	171	168	3	2 %
Cuvette	Loukoléla	47	36	11	29 %
Cuvette-Ouest	Mbomo	68	61	8	13 %
Kouilou	Kakamoeka	116	111	6	5 %
Kouilou	Loandjili	1689	1565	123	8 %
Kouilou	Madingo-Kayes	190	177	13	7 %
Kouilou	Mvouti	37	0	37	inf
Lékoumou	Sibiti	681	647	34	5 %
Niari	Kimongo	496	520	-25	-5 %
Niari	Louvakou (Loubomo)	466	446	21	5 %
Plateaux	Abala	300	295	6	2 %
Plateaux	Djambala	1544	1458	86	6 %
Plateaux	Gamboma	1483	1290	192	15 %
Pool	Kinkala	19	0	19	inf
Pool	Mindouli	78	70	8	11 %
Pool	Ngabé	1499	1119	380	34 %
Pool	Ngamaba	1301	755	546	72 %
Sangha	Ouessou	145	131	14	10 %
Total		14850	13237	1613	12 %

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2025 - prod. 2024) divisé par prod. 2024.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2025. Série AAgWa sur la prévision agricole : l’igname au Congo. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°274. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.274/FR>