


Série AAgWa sur la prévision agricole Le manioc au Congo

Aïssatou Ndoye*, Mansour Dia** et Khadim Dia***

N° 108, février 2024

L série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de neuf produits agricoles majeurs dans près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront

Figure 1. Prévision de la production de manioc au Congo en 2024.




Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

En 2024, la production de manioc au Congo devrait atteindre 1 466 351 tonnes métriques (TM), ce qui correspond à une augmentation de 1 % par rapport aux niveaux de production de 2023. Les districts du sud et du centre devraient produire les volumes de manioc les plus importants, en particulier Ngamaba (Pool), Djambala (Plateaux), Mouyondzi (Bouenza), Kinkala (Pool) et Loandjili (Kouilou), avec des niveaux de production estimés, respectivement, à 132 515 TM, 105 910 TM, 102 773 TM, 90 190 TM et 86 121 TM. En revanche, des valeurs de production plus faibles seront observées à Sembé (Sangha), Souanké (Sangha), Loukoléla (Cuvette), Brazzaville, Mayoko (Niari) et Impfondo (Likouala), avec des valeurs de production atteignant seulement 1 276 TM, 1 808 TM, 2 397 TM, 2 447 TM, 2 969 TM et 3 641 MT.

Les districts du sud tels que Djambala, Mayama (Pool), Kindamba (Pool), Lékana (Plateaux) et Ngamaba devraient connaître les augmentations les plus significatives des volumes de production de manioc en 2024, avec des écarts de 20 850 TM, 13 851 TM, 10 237 TM, 9 237 TM et 7 916 TM, correspondant respectivement à des variations de 20 %, 22 %, 16 %, 42 % et 6 %.

planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°108, nous fournissons des prévisions de la production de manioc au Congo.

Figure 2. Prévision de la production de manioc au Congo en 2023.



Source des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org).

*Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

**Chercheur Associé, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063

*** Chercheur Associé senior, Département Management des données, produits et technologies numériques, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production de manioc au Congo en 2024 au niveau des districts

Provinces	Districts	Production de 2024 (TM)	Production de 2023 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Bouenza	Boko-Songho	17300	18939	-1639	-9%
Bouenza	Loudima	29859	36959	-7100	-24%
Bouenza	Madingou	14696	15260	-565	-4%
Bouenza	Mfouati	7905	7679	226	3%
Bouenza	Mouyondzi	102773	100384	2389	2%
Bouenza	Nkayi District	34456	34729	-274	-1%
Brazzaville	Brazzaville	2447	2357	90	4%
Cuvette	Boundji	11161	12148	-987	-9%
Cuvette	Loukoléla	2397	3972	-1576	-66%
Cuvette	Makoua	11407	13924	-2517	-22%
Cuvette	Mossaka	6902	10683	-3780	-55%
Cuvette	Okoyo	21042	17413	3629	17%
Cuvette	Owando	16853	19554	-2701	-16%
Cuvette-Ouest	Ewo	27832	23602	4231	15%
Cuvette-Ouest	Kéllé	8426	9141	-716	-8%
Cuvette-Ouest	Mbomo	12400	13407	-1007	-8%
Kouilou	Kakamoeka	11416	14053	-2637	-23%
Kouilou	Loandjili	86121	84474	1647	2%
Kouilou	Madingo-Kayes	15643	22250	-6607	-42%
Kouilou	Mvouti	27538	30267	-2729	-10%
Lékoumou	Bambama	3878	3721	157	4%
Lékoumou	Komono	12712	11278	1434	11%
Lékoumou	Sibiti	58988	59893	-905	-2%
Lékoumou	Zanaga	16964	11828	5136	30%
Likouala	Dongou	26167	36002	-9835	-38%
Likouala	Epéna	10821	15229	-4408	-41%
Likouala	Impfondo	3641	5224	-1583	-43%
Niari	Divénié	22429	20933	1496	7%
Niari	Kibangou	23564	32753	-9189	-39%
Niari	Kimongo	19626	20952	-1326	-7%
Niari	Louvakou (Loubomo)	29354	38048	-8693	-30%
Niari	Mayoko	2969	1888	1081	36%
Niari	Mossendjo	32362	32373	-11	0%
Plateaux	Abala	31371	32901	-1530	-5%
Plateaux	Djambala	105910	85060	20850	20%
Plateaux	Gamboma	51596	50944	652	1%
Plateaux	Lékana	21803	12566	9237	42%
Pool	Boko	39631	39486	145	0%
Pool	Kindamba	62366	52129	10237	16%
Pool	Kinkala	90190	85177	5013	6%
Pool	Mayama	62131	48280	13851	22%
Pool	Mindouli	46664	45629	1035	2%
Pool	Ngabé	66784	63631	3153	5%
Pool	Ngamaba	132515	124599	7916	6%
Sangha	Ouessou	20255	24837	-4583	-23%
Sangha	Sembé	1276	1845	-569	-45%
Sangha	Souanké	1808	3353	-1545	-85%
Total		1466351	1451755	14596	1%



TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : $(\text{prod. 2024} - \text{prod. 2023})$ divisé par prod. 2023 .

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2024. Série AAgWa sur la prévision agricole : le manioc au Congo. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°108. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.108/FR>