




Série AAgWa sur la prévision agricole L'arachide en Gambie

Aissatou Ndoye*, Mansour Dia** et Khadim Dia***

N° 79, Octobre 2023


La série de notes de synthèse sur la prévision de la production agricole réalisée par AKADEMIYA2063 vise à fournir, en temps opportun, des données plus précises sur les récoltes et le rendement de neuf produits agricoles majeurs dans près de 50 pays africains. Disposant ainsi, en temps voulu, d'un accès aisé à la grande quantité de données disponibles, les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur pourront planifier et exécuter leurs actions politiques et commerciales de manière plus efficace. Les données publiées dans les notes de synthèse sont

Figure 1. Prévision de la production d'arachide en Gambie en 2023.



Sources des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org)

Figure 2. Prévision de la production d'arachide en Gambie en 2022.



Sources des données : Africa Agriculture Watch (www.aagwa.org)

générées par l'outil Africa Crop Production (AfCP), un modèle prédictif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et appliqué à des données géo-biophysiques de télédétection pour produire des estimations au niveau du pixel et au niveau administratif dès le début de chaque saison de croissance. Dans la note de synthèse N°79, nous fournissons des prévisions de la production d'arachide en Gambie.

En 2023, la production d'arachides en Gambie devrait atteindre 96 063 tonnes métriques (TM), ce qui correspond à une augmentation de 8 % par rapport aux niveaux de production de 2022. Les niveaux de production d'arachide les plus élevés sont attendus dans les districts du nord, en particulier dans les régions de Fulladu West (Maccarthy Island), Upper Baddibu (North Bank), Upper Saloum (Maccarthy Island), Upper Nuimi (North Bank), Lower Nuimi (North Bank) et Jokadu (North Bank), avec des volumes de production estimés à 10 864 TM, 8 074 TM, 7 546 TM, 7 315 TM, 6 143 TM et 5 175 TM, respectivement. En comparaison, des valeurs de production plus faibles seront observées à Nianija (Maccarthy Island), Jarra West (Lower River), Foni Bondali (Western), Jarra East (Lower River), Janjanbureh (Maccarthy Island) et Foni Jarrol (Western), avec des niveaux de production de 100 TM, 178 TM, 231 TM, 279 TM, 304 TM et 337 TM, respectivement.

Les augmentations les plus importantes de la production d'arachide en 2023 devraient se produire à Sandu (Upper River), Fulladu West, Fulladu East (Upper River), Wuli (Upper River) et Niani (Maccarthy Island), avec des écarts de 1 633 TM, 1 025 TM, 647 TM, 647 TM et 509 TM, correspondant à des variations respectives de 109%, 10%, 18%, 16% et 13%.

*Chercheur associé, AKADEMIYA2063

** Chercheur associé, AKADEMIYA2063

***Chercheur associé senior, AKADEMIYA2063



Annexe – Prévisions de la production d’arachide en Gambie en 2023 au niveau des districts

Régions	Districts	Production de 2023 (TM)	Production de 2022 (TM)	Écart (TM)	Variation (%)
Lower River	Jarra Central	1711	1742	-31	-2%
Lower River	Jarra East	279	42	238	567%
Lower River	Jarra West	178	165	13	8%
Lower River	Kiang Central	744	555	189	34%
Lower River	Kiang East	1507	1418	89	6%
Lower River	Kiang West	550	683	-133	-19%
Maccarthy Island	Fulladu West	10864	9839	1025	10%
Maccarthy Island	Janjanbureh	304	292	12	4%
Maccarthy Island	Lower Saloum	1663	1631	32	2%
Maccarthy Island	Niamina Dankunku	655	671	-16	-2%
Maccarthy Island	Niamina East	3856	3674	182	5%
Maccarthy Island	Niamina West	1056	1000	56	6%
Maccarthy Island	Niani	3908	3454	454	13%
Maccarthy Island	Nianija	100	86	14	16%
Maccarthy Island	Sami	3219	3003	216	7%
Maccarthy Island	Upper Saloum	7546	7305	241	3%
North Bank	Central Baddibu	4193	4055	138	3%
North Bank	Jokadu	5175	4969	206	4%
North Bank	Lower Baddibu	2724	2652	72	3%
North Bank	Lower Nuimi	6143	5896	247	4%
North Bank	Upper Baddibu	8074	8029	45	1%
North Bank	Upper Nuimi	7315	7236	79	1%
Upper River	Fulladu East	4276	3629	647	18%
Upper River	Kantora	2439	2229	210	9%
Upper River	Sandu	3124	1492	1633	109%
Upper River	Wuli	3760	3252	509	16%
Western	Foni Bintang Karanai	1164	1219	-54	-4%
Western	Foni Bondali	231	167	64	38%
Western	Foni Brefet	635	631	4	1%
Western	Foni Jarrol	337	278	59	21%
Western	Foni Kansala	471	431	40	9%
Western	Kombo Central	2009	1894	115	6%
Western	Kombo East	1062	973	89	9%
Western	Kombo Saint Mary	1853	1795	59	3%
Western	Kombo South	2937	2793	144	5%
Total		96063	89177	6886	8%

TM (Tonnes Métriques) : 1 TM équivaut à 1 000 kilogrammes.

Variation : se réfère à l'écart relatif, calculé comme suit : (prod. 2023 - prod. 2022) divisé par prod. 2022.

Référence à citer : Ndoye, A., M. Dia et K. Dia. 2023. Série AAgWa sur la prévision agricole : l'arachide en Gambie. Série AAgWa sur la prévision agricole, N°79. Kigali : AKADEMIYA2063. <https://doi.org/10.54067/acpf.79/FR>